

Eene andere hoeveelheid van den bast (2 grm.) werd met wijngeesthoudenden ether getrokken. De vloeistof, uitgedampt, leverde eene geelbruine vette zelfstandigheid, wegende bij 100° C. gedroogd 0.080 grm.; voor 100 grm. bast 4,000 grm.

Met potaschsloog behandeld was deze vette zelfstandigheid voor een groot gedeelte verzeepbaar. Uit de zeepoplossing scheidt zwavelzuur een wit vlokkelig precipitaat af. Wegens de geringe hoeveelheid stof, gelijk hierboven gezegd is, was een nauwkeuriger onderzoek niet doenlijk.

De oorzaak van het schuimen des waterachtigen aftreksels van den bast moet welligt bestaan in de vorming eener soort van zeep, door de daarin bevatte alkaliën met de vette zelfstandigheid (1).

W. R. SEVERING.

*Sycidium Parvei Blkr, eene nieuwe soort van de
Preanger regentschappen.*

Sicyd. corpore elongato antice cylindraceo postice compresso, altitudine 7 circiter in ejus longitudine; capite obtuso convexo $5\frac{1}{2}$ ad $5\frac{3}{4}$ in longitudine corporis; latitudine capitis $1\frac{1}{2}$, altitudine $1\frac{3}{4}$ circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4 ad 5 in longitudine capitis, diametro $1\frac{1}{2}$ ad 2 distantibus; rostro obtuso convexo ante os prominente; rictu obliquo ante oculum desinente; dentibus labialibus gracillimis, maxilla inferiore utroque latere 8 curvatis anteriore et posteriore ceteris longioribus caninis; maxilla superiore dentibus setaceis confertissimis; squamis lateribus 70 p. m. in serie longitudinali; squamis occipitalibus et lateralibus anterioribus squamis lateralibus posterioribus caudalibusque multo minoribus; appendice anali obtusa brevi; pinna dorsali 1^a acuta corpore

(1) Ten einde bovenstaand onderzoek vollediger te kunnen maken, heeft de heer DE LANGE op zich genomen, den resident van Menado nit te noodigen, eene grootere hoeveelheid van gezegden bast herwaarts te zenden, benevens een takje met bladen, bloemen en vruchten, ter bepaling van de soort.

REDAKTIE.

altiore spinis flexilibus 3• ceteris longiore; dorsali radiosa analique corpore humilioribus postico angulatis; pectoralibus latis rotundatis 5 circiter, ventrali infundibuliformi $8\frac{2}{3}$ ad $9\frac{1}{2}$, caudali obtusa rotundata 5 fere in longitudine corporis; colore corpore violaceo-nigricante; pinna caudali aurantiaca peripheria late violacea; pinnis ceteris fusco-violaceis, ventralibus dilutioribus.

B. 4. D. 6—1/10 vel 1/11. P. 21. V. 1/5. A. 1/10 vel 1/11. C. 30 p. m. (lat. brev. inclus.).

Habit. Garut, Provinc. Preanger, Javae occidentalis, in fluviis.

Longitudo 3 speciminum 70''' ad 119'''.

Aanm. Deze soort is kenbaar aan hare oranjekeurige violetgezoomde staartvin, ongevlekte en ongezoomde rug- en aarsvinnen, aan de 8 tanden aan elke zijde in de binnenste rei der onderkaak, aan de talrijke zijschubben, welke op het voorste gedeelte des ligchaams veel kleiner zijn dan meer achterwaarts enz.

Ik noem haar ter eere van den ontdekker, den heer H. A. STEIJN PARVÉ te Garoet, die op uitnoodiging van den heer R. FRIEDERICH, aan wiens bereidwilligheid ik reeds meerdere Preanger vischsoorten te danken heb, eenige zoetwatervisschen te Garoet voor mij heeft verzameld en wel, behalve de boven beschrevene soort, *Trichopus trichopterus* CV., *Betta trifasciata* Blkr. (*Panchax pictum* CV. = *Anostoma pictum* Van Hass.), *Ophicephalus marginatus* CV., *Bagrus planiceps* CV., *Pimelodus platypogon* Van Hass., *Clarius punctatus* CV., *Barbus binotatus* CV., *Leuciscus lateristriatus* Van Hass., *Cobitis Hasseltii* CV. en *Cobitis fasciata* CV.

Batavia 1 Junij 1855.

BLEEKER.

*Nieuwe soorten van Cyclostoma van Pinang
en Borneo.*

In een artikel van den heer W. H. BENSON, opgenomen in de *Annals and Magazine of Natural History* 2e Serie Dl. X.